

脳腫瘍

レジメン名称	使用薬剤		投与量	投与経路	投与日	1コース (日)	適応
	商品名	一般名					
TMZ(初期)療法	テモダール	テモゾロミド	75mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-42	70	悪性神経膠腫
TMZ(維持・再発)療法	テモダール	テモゾロミド	150(200)mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-5	28	悪性神経膠腫
TMZ静注(初期)療法	テモダール	テモゾロミド	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-42	70	悪性神経膠腫
TMZ静注(維持・再発)療法	テモダール	テモゾロミド	150(200)mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-5	28	悪性神経膠腫
BV+TMZ+RT(初期)療法	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注	day1, 15, 29, 42	70	悪性神経膠腫
	テモダール	テモゾロミド	75mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-42		
BV+TMZ(維持)療法	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注	day1, 15	28	悪性神経膠腫
	テモダール	テモゾロミド	150(200)mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-5		
ベバシズマブ維持療法	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	21	悪性神経膠腫